



# 【非小細胞肺 Bev+CDDP+PEM療法について】 (アバステン+シスプラチン+アリムタ)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前             |               |         | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 |
|------------------|---------------|---------|----|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| パンピタン            | 葉酸を含む総合ビタミンです | 1日1回 内服 |    |        | ☐   | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐  | ☐  | ☐  | ☐  | ☐  | ☐  | ☐  | ☐  | ☐  | ☐  | ☐  | ☐  | ☐   |
| アロキシ注<br>デキサート注  | 吐き気止めです       | 10分     | 🧴  |        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 🧴   |
| アリムタ注(500mg/m2)  | 吐き気止めです       | 10分     | 🧴  |        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 🧴   |
| イメンドカプセル         | 吐き気止めです       | 1日1回 内服 | 📄  |        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 📄   |
| シスプラチン注(75mg/m2) | 抗がん剤です        | 60分     | 🧴  |        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 🧴   |
| アバステン注(15mg/kg)  | 抗がん剤です        | 90分     | 🧴  |        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 🧴   |
| デカドロン錠           | 吐き気止めです       | 朝 内服    |    |        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

☝️ 1日目は、抗がん剤の投与開始**60~90分前**に飲んでください。

☝️ 2回目から投与時間が短くなることがあります。

☝️ 腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出してください。

☝️ 1回2錠

☝️ この週はお休みです。

☝️ この週はお休みです。

※ アリムタ注による副作用軽減のため、パンピタン末(葉酸の粉薬)の内服、メチコパール(ビタミンB12)の注射を行います。

## 😊 治療による副作用

:注意が必要な時期

|      |                 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 |  |  |  |  |
|------|-----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|
| 自覚症状 | 過敏症             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |
|      | 食欲不振・吐き気        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |
|      | 皮疹              |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |
|      | 口内炎             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |
|      | 手足のしびれ          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |
|      | 便秘              |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |
|      | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |
| 検査値  | 白血球減少           |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |
|      | 赤血球減少(貧血)       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |
|      | 血小板減少           |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |
|      | 肝機能低下           |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。  
本資料は参考としてお使いください



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

国家公務員共済組合連合会  
大手前病院