



【胃 ラムシルマブ+PTX療法について】
(サイラムザ+パクリタキセル)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前 | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日目 | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------------------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|--|
| | | | デキサート注 ファモチジン注 ポララミン注 | 副作用を抑える薬です | 30分 | 💧 | | | | | | | 💧 | | | | | | | 💧 | | | | | | | | | | | | | |
| サイラムザ注(8mg/kg) | 抗がん剤です | 60分 | 💧 | | | | | | | | | | | | | | 💧 | | | | | | | | | | | | | | | 💧 | |
| パクリタキセル注(80mg/m2) | 抗がん剤です | 60分 | 💧 | | | | | | | 💧 | | | | | | | 💧 | | | | | | | | | | | | | | | 💧 | |



この週はお休みです。

😊 **治療による副作用**

| | | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日目 | |
|------|-----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|
| 自覚症状 | 過敏症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 食欲不振・吐き気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 口内炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 手足のしびれ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査値 | 白血球減少 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 赤血球減少(貧血) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血小板減少 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 肝機能低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- **手足のむくみ** (治療回数が増えると生じることがあります。気になる症状がありましたらお知らせください。)
- **爪の変化** (爪の変色、爪の周囲が赤くなったり痛いなどの症状がありましたらお知らせください。)
- **血圧上昇** ● **出血(鼻血など)** ● **タンパク尿** ● **胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など)** ● **傷の治りが遅い**
- **血栓・塞栓** (足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。
本資料は参考としてお使いください。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

国家公務員共済組合連合会
大手前病院