




【胆 S-1+GEM療法について】 (エスワンタイホウ+ゲムシタビン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
グラニセロン注 デキサート注	吐き気止めです	5分																						
ゲムシタビン注(1000mg/m ²)	抗がん剤です	30分																						
エスワン錠(60mg/m ²)	抗がん剤です	朝・夕 内服																						
デカドロン錠	吐き気止めです	内服																						

😊 **治療による副作用**

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
検査値	食欲不振・吐き気																							
	口内炎																							
	下痢																							
	手足症候群																							
	色素沈着																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							
	肝機能低下																							



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。
本資料は参考としてお使いください。

国家公務員共済組合連合会
大手前病院