



【リンパ腫 CVP療法について】 (エンドキサン+オンコビン+プレドニゾン)





様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
グラニセトロン注 プレドニン注(100mg/body)	吐き気止めです	30分																							
オンコビン注(1.4mg/m ²)	抗がん剤です	10分																							
エンドキサン注(750mg/m ²)	抗がん剤です	60分																							
プレドニゾン錠(100mg/body)	ステロイドです	朝・昼 内服																							



胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。
免疫が低下しますので、手洗い・うがいを心がけましょう。

朝 10 錠、昼 10

:注意が必要な時期

😊 **治療による副作用**

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
	不眠																							
	胃部不快感																							
	口内炎																							
	便秘																							
	手足のしびれ																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							

食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。

寝つきが悪くなる時があります。症状があるときはお知らせください。

胃の痛みやゲップ、むかつき、腹部膨満感、食欲がないなど、気になる症状があるときはお知らせください。

口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。

水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。

手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。

髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。

感染しやすくなりますので、手洗い・うがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。

貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。

出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

本資料は参考としてお使いください
国家公務員共済組合連合会
大手前病院