



【リンパ腫 R-THP-COP療法について】 (リツキシマブ+テラルピシン+エンドキサン+オンコビン+プレドニゾン)



様

コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前		作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
アセトアミノフェン錠	アレルギー様症状を抑える薬です	1日1回 内服		☉																					☉
ニボラジン錠		1日1回 内服		☉																					☉
グラニセトン注 プレドニン注(40mg/body) ハイドロコトロン注	副作用を抑える薬です	30分		💉																					💉
リツキシマブ注(375mg/m2)	抗がん剤です	3~6時間		💉																					💉
オンコビン注(1mg/m2)	抗がん剤です	10分		💉																					💉
テラルピシン注(30mg/m2)	抗がん剤です	30分		💉																					💉
エンドキサン注(500mg/m2)	抗がん剤です	60分		💉																					💉
プレドニゾン錠(40mg/body)	ステロイドです	朝 内服			☉	☉	☉	☉																	

1回1錠

1回1錠

この週はお休みです。

この週はお休みです。

尿が赤くなることがあります。

胃を荒らすことがありますので胃薬と一緒に飲みます。免疫が低下しますので、手洗いうがいを心がけましょう。

☺ **治療による副作用**

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	アレルギー様症状																							
	食欲不振・吐き気																							
	不眠																							
	胃部不快感																							
	口内炎																							
	便秘																							
	手足のしびれ																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							

朝8錠

:注意が必要な時期

心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

本資料は参考としてお使いください
国家公務員共済組合連合会
大手前病院