



# 【乳 T-DM1療法について】 (カドサイラ)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強に残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																					1日目		
生食50ml		5分	💧																					💧		
カドサイラ注(3.6mg/kg)	抗がん剤です	90分(30分)	💧	2回目から点滴時間が短くなることがあります。							この週はお休みです。							この週はお休みです。								💧
生食50ml		5分	💧																					💧		

😊 **治療による副作用**

: 注意が必要な時期

		1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																					1日目	
自覚症状	過敏症																							
	心機能低下																							
	食欲不振・吐き気																							
	手足のしびれ																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	肝機能低下																							

\* 実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

本資料は参考としてお使い下さい  
**国家公務員共済組合連合会  
 大手前病院**



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。