



【乳 HER+PER療法について】 (パージェタ+ハーセプチン)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	1日目
パージェタ注 (初回: 840mg/body) 以降: 420mg/body	抗がん剤です	60分(30分)																					
ハーセプチン注 (初回: 8mg/kg) 以降: 6mg/kg	抗がん剤です	90分(30分)																					
			2回目から投与時間が短くなる場合があります。										この週はお休みです。			この週はお休みです。							

😊 治療による副作用

 : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	1日目	
自覚症状	過敏症																						
	心機能低下																						
		痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。 動悸や息切れ、むくみが現れた場合はお知らせください																					



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

* 実際の投与スケジュールと異なる場合があります。
本資料は参考としてお使い下さい

国家公務員共済組合連合会
大手前病院