



**【乳 EC療法について】**  
(エピルピシン+エンドキサン)



様  コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用			めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
イメンドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服				1日目は、抗がん剤の投与開始 <b>60~90分前</b> に飲んでください。																								
アロキシ注 デキサート注	吐き気止めです	15分																												
デカドロン錠	吐き気止めです	内服																												
エピルピシン注 (90mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	30分		尿の色が赤くなることがあります。																										
エンドキサン注 (600mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	60分																												

😊 **治療による副作用**

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																							
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																							
	排尿時の不快感、尿に血が混ざるなどの症状があるときはお知らせください。																							
	口内炎																							
口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																								
色素沈着																								
肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																								
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																								
髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。																								
検査値	白血球減少																							
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																							
	赤血球減少(貧血)																							
貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																								
血小板減少																								
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																								

心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

**\* 実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい**



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

**国家公務員共済組合連合会  
大手前病院**